

BROMEXAN

JARABE

FÓRMULA:

Cada cucharadita (5 mL) contiene:

Bromhexina HCl 4 mg

Excipientes, c.s.

ACCION FARMACOLOGICA: La bromhexina se comporta como un mucolítico y expectorante por activación de las glándulas seromucosas. En la secreción procedente de las células glandulares serosas se comprueba abundantes lisosomas, cuyas enzimas fisiológicas fragmentan las fibras de mucopolisacáridos ácidos, lo que determina una disminución de la viscosidad de la secreción bronquial y la activación de la expectoración.

Recientes estudios han demostrado que la bromhexina aumenta el volumen de la secreción lagrimal y su contenido en lisozima

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Mucolítico y expectorante. Está indicado como coadyuvante para la terapia secretolítica en enfermedades broncopulmonares crónicas y agudas, asociadas con una secreción mucosa anormal y deterioro de transporte mucoso.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, durante la lactancia, úlcera péptica.

PRECAUCIONES GENERALES: Dado que en pacientes con enfermedad hepática grave o insuficiencia renal severa, la eliminación del producto se puede ver afectada, por lo que se recomienda una vigilancia durante la duración del tratamiento con este producto.

ADVERTENCIAS: No se han realizado estudios en mujeres embarazadas. Por ello, únicamente se acepta el empleo de bromhexina en embarazadas en el caso de que no exista otra alternativa más segura.

No se conoce si la bromhexina pasa a la leche materna en cantidades significativas ni el efecto que podría tener en el lactante. Consulte a su médico si debe continuar el tratamiento durante la lactancia.

En caso de alergia a bromhexina. Si experimenta algún tipo de reacción alérgica deje de administrar el medicamento y avise inmediatamente a su médico o farmacéutico.

No use en pacientes con úlcera de estómago.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:

Ocasionalmente pueden presentarse efectos gastrointestinales moderados. En ocasiones se han reportado reacciones alérgicas como: rash cutáneo, broncospasmo, angioedema y anafilaxis.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO

GÉNERO: La administración de bromhexina de manera

concomitante con antibióticos (amoxicilina, cefuroxima, eritromicina, doxiciclina) resulta en una mayor concentración de los mismos en el tejido pulmonar.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:

No se han reportado hasta la fecha, en caso de presentarse se recomienda tratamiento sintomático.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

Niños de 6 a 12 años: 1 cucharadita (5 ml) 3 veces al día.

Niños de 2 a 6 años: ½ cucharadita (2.5 ml) 3 veces al día.

Niños menores de 2 años: ¼ cucharadita (1.25 ml) 3 veces al día.

PRESENTACION: Frasco con 120 mL

USESE POR PRESCRIPCION MEDICA.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONSERVESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

Fabricado por:

LABORATORIO SAN LUIS, S. A.

Santo Domingo, Rep. Dom.

Reg. Ind. 9546

Reg. San.: no. 2009-1481