

**DERMASTEN®**  
**PERMETRINA AL 5%**  
**Crema tópica**

**COMPOSICIÓN:**

Cada g de crema contiene:

Permetrina.....50 mg

Excipientes, c.s.

**ACCIÓN FARMACOLÓGICA:** La permetrina es un piretroide de sintético, fotoestable con alta efectividad polivalente y nítida selectividad en su acción insecticida, y en el caso de la escabiosis ha demostrado una alta eficacia. Debido a su alta liposolubilidad, la permetrina penetra rápidamente hacia su sitio de acción (membrana celular nerviosa del insecto). Es un insecticida de contacto que perturba el influjo nervioso interviniendo por vía electrofisiológica; despolariza ligeramente la membrana nerviosa y provoca cierto grado de bloqueo del potencial de acción de la célula sometida a acción eléctrica. Es atacada por la enzima estearasa pero de manera lenta, lo que origina poca destoxificación y la muerte del insecto sobreviene inexorablemente.

Farmacocinética: Absorción: Menos del 2 % de la dosis administrada tópicamente se absorbe a través de la piel. La máxima absorción ocurre durante las primeras 48 horas después de su aplicación. Distribución: Se almacena en el tejido adiposo del cuerpo. Metabolismo: Se metaboliza rápidamente mediante hidrólisis del éster a metabolitos inactivos. Comienzo de la acción: De inmediato. Eliminación: Principalmente en la orina.

**INDICACIONES:** Tratamiento de la escabiosis por *Sarcoptes scabiei*, y la pediculosis. Permetrina 5% crema puede considerarse el tratamiento de elección de la escabiosis por ser el más eficaz y tener menos riesgos que los demás.

**CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad conocida al medicamento, a los piretroides sintéticos, a las piretrinas o a las crisantemas.

**REACCIONES ADVERSAS:** Eventualmente podría provocar prurito, enrojecimiento o edemas, eczema, rash, manifestaciones irritativas que son leves y transitorias.

**PRECAUCIONES:** Sensibilidad cruzada y/o problemas asociados: Los pacientes que no toleran los insecticidas veterinarios que contienen permetrina tampoco tolerarán la crema de permetrina. Además los pacientes que no toleran otros piretroides sintéticos, tales como aquellos que se encuentran en los insecticidas para el hogar, o que no toleran las piretrinas o crisantemas, pueden no tolerar tampoco esta medicación. Embarazo/lactancia: No se aconseja administrar a mujeres embarazadas únicamente cuando se haya hecho una valoración riesgo-beneficio y ésta sea favorable.

Descontinuar o evitar su uso durante la lactancia. No debe aplicarse en áreas abiertas o agudamente inflamadas de la piel, en cara (con excepción de las sienes y en la frente), ojos, mucosas o meato uretral.

Niños: Es seguro y eficaz en niños de dos años de edad o mayores. Su seguridad y efectividad entre 2 y 23 meses de edad está limitada. Sólo deberá emplearse en este grupo de edad valorando la relación riesgo/beneficio.

Se requieren buenos hábitos de salud para impedir la reinfección o el contagio de la infección en otras personas.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:** ninguna reportada.

**ADVERTENCIAS:** Evitar el contacto con los ojos, si ocurre contacto accidental con los ojos, el paciente deberá lavarlos con abundante agua y notificarlo al médico. Si se desarrolla hipersensibilidad descontinúe su uso. Si persisten las molestias consulte al médico. La infestación por el *Sarcoptes scabiei* generalmente está acompañada por prurito, edemas y eritemas, el tratamiento con permetrina puede exacerbar temporalmente estas condiciones. Si el prurito persistiera después de 2 semanas de tratamiento deberá consultar al médico. Este producto contiene Bisulfito de Sodio, un sulfito que puede causar reacciones alérgicas, incluyendo síntomas anafilácticos que amenacen la vida, o ataques asmáticos de menor gravedad en ciertas personas susceptibles.

**DOSIS Y VIA ADMINISTRACION:** tópica.

Se debe aplicar una capa fina sin necesidad de dejar que ésta sea visible.

Adultos y niños mayores de 12 años: Aproximadamente 30 g. Algunos adultos pueden necesitar otros 30 g.

Niños de 5 a 12 años: Aproximadamente medio tubo.

Niños de 2 a 5 años: Aproximadamente 1/4 del tubo.

Niños de 2 a 23 meses: Sólo se empleará por estricta supervisión médica, valorando la relación riesgo/beneficio y se recomienda entre 1/8 a 1/4 del tubo.

Instrucciones para su uso: Aplicar con un masaje la crema, en las zonas afectadas del cuerpo, desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies, entre los dedos inclusive. Repetir la aplicación en las manos si se lavan con agua y jabón en un período comprendido en las 8 horas después de su aplicación. Después de transcurridas de 12-14 horas de su aplicación la crema deberá eliminarse con un baño. Si fuera necesario una segunda aplicación será de 7 a 10 días después de la primera, sólo si persiste el ácaro vivo o lesiones nuevas

**Tratamiento de los contactos:** Tratar a la vez a todos los miembros sintomáticos de la familia. Tratar a los contactos sexuales. Tratar a todos los compañeros de habitación y a los cuidadores si presentan síntomas. Lavar la ropa interior,

vestidos, sábanas y toallas. Aspirar habitación en caso de sarna noruega a causa de la gran cantidad de ácaros presentes bajo las costras.

**SOBREDOSIFICACIÓN:** En caso de ingestión errónea, accidental o con fines suicidas sólo puede provocar manifestaciones de intolerancia gastrointestinal (epigastralgia, náuseas, vómitos, diarreas) ya que es muy poco tóxico para el hombre y podría efectuarse un lavado gástrico y adoptar medidas terapéuticas para contrarrestar los síntomas de este accidente.

En sobredosificación tópica se producen: sequedad, agrietamiento de la piel y eventualmente manifestaciones de hipersensibilidad cutánea. En caso de reacción tópica, discontinuar el tratamiento y aplicar cremas suavizantes. Si hubiera reacciones alérgicas, administrar corticosteroides y antihistamínicos.

**PRESENTACIÓN:** Caja conteniendo tubo con 30 g.

SOLO PARA USO EXTERNO.  
USESE POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA.  
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
CONSERVESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

**Producto elaborado  
en República Dominicana por  
LABORATORIO SAN LUIS, S. A.  
Reg. Ind. 9546  
Reg. San. No.: 2009-0398**