

## Peptacid® Pediátrico Suspensión

### Fórmula:

Cada mL (aproximadamente 35 gotas) contiene:

Simeticona ..... 100 mg

Excipientes, c.s.

### Acción farmacológica:

La simeticona es un agente antiflatulento, activo por vía oral que se utiliza para aliviar el dolor y las molestias abdominales ocasionadas por la presión de un exceso de gases. Químicamente es un polímero lineal de siloxanos metilados, con un número de unidades entre 200 y 350 dependiendo de su viscosidad. La simeticona no se absorbe por vía oral.

La simeticona actúa dispersando y previniendo la formación de burbujas de gases rodeadas de mucosidades reduciendo la tensión superficial de las burbujas. Se trata de un agente antiespumante.

La simeticona no se absorbe y es eliminada en las heces. Por tratarse de una molécula inerte, no es transformada por la flora gastrointestinal.

### Indicaciones:

Prevención y Tratamiento de la dispepsia transitoria del lactante y flatulencia (cólicos del lactante).

### Interacciones medicamentosas:

No se han comunicado interacciones con otros fármacos o plantas medicinales.

### Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.

### Precauciones:

En caso de agravación o persistencia de los síntomas, consultar al médico.

No exceder la dosis recomendada.

### Efectos secundarios:

No se han informado efectos secundarios por el uso de la simeticona.

### Dosificación y vía de administración: ORAL

Para el alivio de los síntomas debidos a gases como presión, distensión o sensación de plenitud.

Niños de 2-12 años: 40 mg (12 a 15 gotas) por vía oral cuatro veces al día

Niños de < 2 años: la dosis debe ser indicada por el médico. La dosificación pediátrica debe estar basada en la severidad de la condición y el área de superficie corporal del paciente, más que por el peso corporal. 20 mg (5 a 7 gotas) por vía oral 4 veces al día.

Dosis máxima: 240 mg/día

Se puede administrar mezclada con leche, bebidas o alimentos.

Agítese bien antes de usar.

### Sobredosificación:

Aunque no es de esperar fenómenos de intoxicación, en caso de ingestión accidental, consultar al médico.

### Presentación:

Frasco gotero con 30 mL

AGITASE BIEN ANTES DE USAR.  
USESE POR PRESCRIPCION MEDICA.  
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
CONSERVESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

Producto elaborado  
en República Dominicana por  
LABORATORIO SAN LUIS, S. A.  
Reg. Ind.: 9546  
Reg. San.: 2006-1042