

## PEPTACID®

Suspensión oral  
Antiácido,  
Antiflatulento.

### COMPOSICION:

Cada cucharadita (5 mL.) contienen:

Hidróxido de magnesio	200 mg
Hidróxido de aluminio (equivalente a gel desecado)	200 mg
Simeticona (Dimetilpolisiloxano)	20 mg
Excipientes, c.s.	

### ACCION FARMACOLOGICA:

Es la combinación super concentrada de dos antiácidos (hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio) y un antiespumante inerte (simeticona) que proporcionan un efecto sinérgico para el tratamiento de los síntomas gastrointestinales producidos por la hipersecreción ácida. Los fármacos utilizados son de acción rápida, elevan el pH del contenido gástrico por acción neutralizante del ácido clorhídrico del jugo gástrico. Por otra parte al neutralizarse el ácido gástrico con la utilización del hidróxido de aluminio y magnesio, se inactiva la acción proteolítica de la pepsina. La simeticona es un antiespumante inerte que actúa en la burbuja del gas formado, disminuyendo la tensión superficial con lo que esta se fragmenta facilitando la expulsión de gases, previniendo y aliviando de esta manera la distensión intestinal. La absorción de PEPTACID es escasa, debido a la poca solubilidad de sus principios activos, su eliminación es principalmente por heces.

### INDICACIONES:

Antiácido-antiflatulento de alta concentración con doble acción neutralizante y antiespumante, auxiliar en gastritis aguda y crónica, gastritis postetílica, gastritis posprandial por abuso de capsaicina (chile, pimiento), agruras, hiperacidez gástrica por exceso de alimentos y bebidas, esofagitis por reflujo, hiperclorhidria, hernia hiatal, cuadros dispépticos (mala digestión) distensión abdominal.

### INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

No se administre en forma simultánea con digitálicos, fenotiacinas, propranolol, tetraciclinas debido a que puede disminuir su absorción. Se recomienda espaciar su administración con estos medicamentos cuando menos una hora.

### CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:

Insuficiencia renal aguda y crónica, cálculos de vías urinarias, hipersensibilidad a los principios activos. Administrarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal y severamente debilitadas. No administrar concomitantemente con tetraciclinas.

### PRECAUCIONES:

No rebasar la dosis recomendada. No se use en caso de sangrado de tubo digestivo. No se use por periodos prolongados sin consultar a su médico. Como en la mayoría de los

medicamentos, su administración en el primer trimestre del embarazo, queda bajo criterio médico

**REACCIONES ADVERSAS:**

En presencia de insuficiencia renal puede causar depresión del sistema nervioso central. A grandes dosis puede causar estreñimiento y/o diarrea.

**MEDIDAS EN CASO DE INTOXICACION:**

Vaciamiento del estómago, induciendo emesis o por lavado gástrico, administración de carbón activado, monitoreo y mantenimiento de las funciones vitales, corrección de la hipertermia.

**VIA DE ADMINISTRACION Y DOSIS: Oral.**

Suspensión: 5 ml = 1 dosis.

Tomar un 5 ml cada 6 a 8 horas (dosis máxima al día).

Se recomienda no sobrepasar la dosis sugerida.

Uso pediátrico (consulte siempre a su médico).

**AGÍTESE BIEN ANTES DE USARLO.**

**EVÍTESE CONGELACION.**

**CONSERVE EL FRASCO BIEN TAPADO.**

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ÚSESE POR PRESCRIPCION MEDICA.**

**PRESENTACION:**

Frasco con 120 mL.

Elaborado por:

LABORATORIO SAN LUIS, S. A.

SANTO DOMINGO, REP. DOM.

Reg. Ind. 9546

Reg. San. No.: