

## PREMAMA®

### Suplemento de Vitaminas y Minerales Prenatal y Postparto

#### Composición:

##### Cada Capleta Contiene:

|  |         |
|--|---------|
| Vitamina A .....                               | 3000 UI |
| (50% beta-caroteno y 50% vitamina A ACETATO)   |         |
| Vitamina C (ácido Ascórbico).....              | 100 mg  |
| Vitamina D (colecalfiferol).....               | 250 UI  |
| Vitamina E (DL-alfa tocoferol acetato).....    | 30 UI   |
| Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina).....      | 3 mg    |
| Vitamina B2 (Riboflavina).....                 | 3.4 MG  |
| Niaciamida.....                                | 20 MG   |
| Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina).....   | 10 mg   |
| Ácido Fólico.....                              | 1 mg    |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina).....            | 12 mcg  |
| biotina.....                                   | 30 mcg  |
| Ácido pentotónico (pantotenato de calcio)..... | 10 mg   |
| calcio (carbonato de calcio).....              | 50 mg   |
| Hierro (fumarato ferroso).....                 | 60 mg   |
| Yodo (yoduro de potasio).....                  | 150 mcg |
| magnesio (óxido de magnesio).....              | 50 mg   |
| zinc (óxido de zinc).....                      | 25 mg   |
| selenio (Aspartato de selenio).....            | 25 mcg  |
| cobre (óxido de cobre).....                    | 2 mg    |
| manganeso (sulfato de manganeso).....          | 5 mg    |
| cromo (cloruro de cromo).....                  | 25 mcg  |
| molibdeno (molibdato de sodio).....            | 25 mcg  |
| Exipientes, c.s.                               |         |

**DESCRIPCIÓN:** Durante el embarazo y la lactancia existe un aumento de las necesidades de vitaminas, minerales y oligoelementos. Premama® es un Suplemento de Vitaminas y Minerales esenciales, formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de la mujer desde el momento en que planifica un embarazo hasta la lactancia, muy necesarios para proteger la salud de la mujer embarazada y su bebé.

**INDICACIONES:** Embarazo, lactancia y Para las deficiencias de cualquiera de las vitaminas de la fórmula

**CONTRAINDICACIONES:** Está contraindicado en pacientes hipercalcémicos e hipersensibles a alguno de los componentes de la fórmula.

**REACCIONES SECUNDARIAS:** Al iniciar el consumo del producto pueden aparecer síntomas dispépticos, que desaparecen luego de administraciones subsecuentes del mismo.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

**DOSIS:** Se recomienda el consumo de una capleta en medio de una comida principal, una vez por día, o según recomendaciones del médico tratante.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ÚSESE POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA.

CONSERVESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

Producto elaborado en U.S.A.

Para Laboratorio San Luis, S.A.

Por Arnet Pharmaceutical Corp.

Santo Domingo, República Dominicana

Reg. Ind. No. 18055      Reg. San: 2005-0619